



平成 28 年 10 月 31 日

すっかり秋めいて、朝晩は寒くなりましたね。そろそろ「やけど」の患者様が増えてきました。今回はあらためてですが、やけどについて述べていきたいと思います。

やけどをしたら…



まずは

水道水で冷やす！

- ◆ 最低10分以上。20~30分を目安に
- ◆ 冷やしすぎに注意(氷・保冷剤は過冷却の原因)



こんな感じ
もっと分厚くても可

次に

濡れタオルで 冷やしながら来院

参考文献：日本皮膚科学会・日本熱傷学会

やけどをしたら、まずすぐに冷やすのはみんな出来ています。が、その後どうしたらいいかわからない方が多いんですよね。とにかく冷やし続けることが大事です。

次に「傷跡は残りますか?」という質問がよくあるのですが、傷がキレイに早く治るためにには次の事項が大事です。

日本
わかりやすい説明
(だと思います)

傷がキレイに早く治るためには…

「wound bed preparation (WBP:創面環境調整)」「moist wound healing (MWH:湿潤環境下療法)」等の最新の創傷治癒概念を、わかりやすくまとめてみました。

最初に異物の除去を

- 傷口に異物があると治りが悪いです。受傷時、治癒過程時に洗ってください。

感染しないように

- 細菌感染をしていると治りが悪いどころか悪化の可能性も。患部の消毒は確かに殺菌作用はありますが正常な皮膚の細胞をも傷つけてしまうため、明らかな感染徴候が無い限りお勧めできません。傷口の洗浄、抗生素質外用にて対応していきましょう。

浸出液を含んだ潤いは大事ですよ

- 浸出液には傷を治す物質がいっぱい含まれています。乾燥をさせてはせっかくの浸出液がうまく行きわたりません。潤いを保たせてください。

傷の縁は順調に治ってきてますか？

- 傷は縁から徐々に治っていくものです。治癒過程で出現する壊死物質、不良肉芽(無駄な皮膚の盛り上がり)が傷の治りを邪魔します。適宜除去をしたり処置を変更したりの、日々のコントロールが必要です。

私は上記の表を常に念頭において、治療に携わってます。最後にこちらもよく聞かれる事ですが、図にまとめてみました。

Q. キズパワーパッドってどうなんでしょうか？

A. 良いと思いますが、過信は禁物です

- ・湿潤療法が簡便に出来るすぐれものです。従来の絆創膏よりも早い治癒につながります。ですが、絆創膏に比べてかぶれやすかったり、感染症を併発しやすいです。



ドレッシング材は基本的に水分を保持する作用を持つが、滲出液の吸収力が材型によってそれ自体異なるため、滲出液の量に応じて選択することで創傷治癒に適切な湿潤環境を調整できる。また、滲出液の量以外にも、個々のドレッシング材の材型や形態などを十分に理解したうえで使用することをすすめる。不適切な使用は、感染を誘発したり、創傷治癒をかえって妨げることがあるので注意が必要である。

日本皮膚科学会・創傷・熱傷ガイドライン委員会報告より抜粋

ドレッシングの比較		
	ガーゼドレッシング	閉塞性ドレッシング
利点	①安価、②材料が容易に入手可能、③外界から創が見えない、④物理的刺激から守る、⑤施設が容易、⑥滲出液を吸収、⑦ある程度の保温が可能	①湿潤環境が作れる、②使用手技が容易、③酸素分圧を低下できる、④貼布したまま入浴できる、⑤デリードマン効果、⑥疼痛緩和作用を有する
欠点	①湿潤環境が作れない、②創面に固着しやすい、③酸素分圧の低下なし	①創周囲皮膚炎の可能性、②高価
適応	感染のない一次縫合創、浅く小さな切創	褥瘡、熱傷、下腿潰瘍、擦過傷などで感染が軽微
非適応	上記以外すべて不適応「乾燥させれば早く治癒する」という誤解による	重篤な感染を併発した創

左：ガーゼとドレッシング材との比較

右：ドレッシング材の種類にわざを症状に応じて使い分けます

表7 滲出液の量とドレッシング材の選択

滲出液	適するドレッシング材
普通～少ない	ポリウレタンフィルム ハイドロコロイド
少ない（乾燥した壞死組織あり）	ハイドロジェル
多い	アルギン酸塩 キチン ハイドロファイバー® ハイドロポリマー ポリウレタンフォーム

参考資料: Johnson & Johnson・日本皮膚科学会・日本創傷治癒学会

ちょっと専門的になってしましましたが、私はそれだけやけどの治療にはこだわりがあり、少しでもきれいに早く治してあげられる自信があります。やけどをしたら是非とも三和皮フ科に受診してください。その「やけど」、きれいに治してみせますよ！

那加中学校の子たちが職場体験にきました！2日間でしたが病院の流れや様子を見て、今後の将来に少しでも役立てるものがあったらいいな～と思います^~^



医院：各務原市那加桜町2-368

Tel 383-6800

自宅：各務原市三井北町1-171

Tel 382-1437

三和ゆき後援会事務所（三和皮フ科北）

Tel 371-5558

三和皮フ科HP：<http://miwahifuka.org/>